



Ipratropio



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el ipratropio?

El ipratropio es un medicamento que abre los bronquios y las vías por las que entra el aire a los pulmones.

Ipratropio sirve para tratar dificultades para respirar que producen las siguientes enfermedades:

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también se conoce por las iniciales EPOC. Esta enfermedad produce un estrechamiento de las vías respiratorias. Por eso, entra poco aire a los pulmones y cuesta respirar.
- Bronquitis crónica.
- Enfisema, que es una enfermedad grave de los pulmones.

Este medicamento es para niños mayores de 6 años, adolescentes y adultos.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando uses ipratropio.
- No utilices ipratropio para una crisis respiratoria repentina.
- Avisa a tu médico si tienes un problema respiratorio grave y empeoras con rapidez.
- Avisa a tu médico si no notas mejoría o empeoras mientras usas ipratropio.
- Avisa a tu médico si usas ipratropio y notas que te hace mucho efecto o muy poco efecto.
- Ten cuidado para que no entre ipratropio en los ojos. Si entra el medicamento en los ojos, puedes sentir dolor y molestias, visión borrosa o enrojecimiento de los ojos. Lávate los ojos con agua templada, deja de usar ipratropio y avisa a tu médico.



¿Puedo tomar ipratropio?

Nunca tomes ipratropio

- Cuando tienes alergia al ipratropio.
- Cuando tienes alergia a la atropina o a sus derivados.
Estas sustancias reducen la salivación y resecan las vías respiratorias.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar ipratropio

- Fibrosis quística, es una enfermedad grave que afecta a los pulmones y otros órganos.
- Glaucoma, que es una enfermedad grave del ojo.
- Problemas de próstata, que es un órgano que forma parte del aparato reproductor de los hombres.



- Problemas para orinar.
- Problemas de riñón.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar ipratropio

- Anticolinérgicos y otros inhaladores, que se toman para la EPOC.



¿Cuánto ipratropio puedo tomar?

- Niños mayores de 6 años y personas mayores de 18 años:
Lo habitual son 2 aspiraciones 4 veces al día.
La cantidad máxima es de 12 aspiraciones al día.



¿Cómo debo tomar ipratropio?

Ipratropio se aspira por la boca.

Hay que utilizar un inhalador para aspirar el medicamento.

Un inhalador es un aparato que sirve para tomar medicamentos inhalados por la nariz o por la boca.

Estos medicamentos sirven para tratar diferentes problemas de salud, por ejemplo, bronquitis o asma.

Hay diferentes tipos de inhaladores.

Recomendaciones generales para los inhaladores

- Aprende a usar bien tu inhalador.
Lee despacio las instrucciones.
- Sigue las indicaciones de tu médico y si tienes dudas, pregunta.
- Después de tomar un medicamento con inhalador aclárate la boca con agua.



Salud más fácil

- Lava tu inhalador 1 o 2 veces a la semana con agua templada y jabón, pero no mojes la parte metálica.
Después déjalo secar.

¿Cómo debes dejar de usar ipratropio?

Tu médico te dirá el tiempo que debes usar ipratropio.
Nunca dejes de usar ipratropio sin que te lo diga tu médico, aunque te sientas bien.



Deja de tomar ipratropio de forma inmediata

Deja de tomar ipratropio y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Sarpullidos y picores.
- Tos.
- Pitidos.
- Problemas para respirar.
- Hinchazón en la lengua, la garganta, los labios o la cara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas ipratropio, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar ipratropio?

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más ipratropio del debido?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas ipratropio y cuánto has inhalado.

Los síntomas que puedes tener con una sobredosis son sequedad en la boca, latido más rápido del corazón y visión borrosa.



Efectos adversos de ipratropio

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Ipratropio puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Dolor de cabeza.
- Mareo.
- Tos.
- Faringitis, que es la irritación de la garganta.
- Dificultad para respirar.
- Boca seca.
- Estreñimiento o diarrea.
- Vómitos.

Ipratropio puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas ipratropio, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



Comunicación de efectos adversos

Si te sientes mal después de tomar el medicamento,
avisa a tu médico o farmacéutico.

También puedes comunicarlo a través de esta página web:

<https://www.notificaram.es>



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

SANDOZ

Con el aval de

