



Metroclorpramida



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve la metoclorpramida?

La metoclorpramida es un medicamento que sirve para tratar y prevenir las ganas de vomitar y los vómitos.

Metoclorpramida se utiliza para prevenir:

- Ganas de vomitar y los vómitos después de la quimioterapia o de la radioterapia para tratar el cáncer.
- Ganas de vomitar y los vómitos provocados por una migraña. Una migraña es un dolor muy fuerte de cabeza. Puedes tomar metoclorpramida junto con otros medicamentos en el caso de migrañas.

Este medicamento es para mayores de 18 años.

Los menores de 18 años solo pueden tomar metoclorpramida cuando no funcionan otros tratamientos.

Los menores de 1 año no pueden tomar este medicamento.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes metoclopramida.
- Cuando tomas metoclopramida, tu médico te hará análisis para controlar los niveles de pigmentos en tu sangre. Los pigmentos son la parte de la sangre que le da el color.
- Siempre hay que esperar 6 horas entre una toma y otra, aunque hayas vomitado o expulsado el medicamento.



¿Puedo tomar metoclopramida?

Nunca tomes metoclopramida

- Si tienes alergia a la metoclopramida.
- Cuando el estómago o el intestino sangran o están taponados.
- Cuando tienes un tumor en una parte del riñón llamada glándula suprarrenal.
- Cuando hayas tomado medicamentos para tratar temblores en los músculos.
- Cuando tienes epilepsia, que es una enfermedad que provoca convulsiones o temblores y puede ser que pierdas el conocimiento.
- Cuando tienes Parkinson, que es una enfermedad que provoca temblores, que te muevas torpe y tengas los músculos rígidos.
- Si alguna vez los niveles de pigmentos que dan el color a tu sangre no han sido los adecuados.



Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar metroclopramida

- Problemas en el cerebro.
- Problemas en el hígado o en los riñones.
- Cuando has tenido problemas con el ritmo de tu corazón.
- Cuando el nivel de sales en sangre no es el adecuado.
- Cuando tienes más de 65 años y además tienes problemas de salud en general.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar metroclopramida

- Contra el Parkinson.
- Medicamentos que afectan al ritmo de tu corazón.
- Para calmar espasmos o calambres del estómago.
- Medicamentos procedentes de la morfina, cuando tienes dolores muy fuertes.
- Calmantes, utilizados para tratar problemas de salud mental.
- Para tratar la falta de oxígeno del corazón.
- Para tratar algunos problemas en las defensas de tu cuerpo.
- Relajantes musculares.
- Antidepresivos.



¿Cuánta metroclopramida puedo tomar?

- **Personas adultas**
La cantidad recomendada es una pastilla de 10 miligramos cada vez.
Puedes repetir la toma hasta 3 veces al día.
No tomes metoclopramida más de 5 días.
- **Niños y adolescentes de 1 a 18 años**
La cantidad que deben tomar es diferente, depende de la edad y el peso.



El médico te dirá la cantidad que debes tomar.

No se recomienda que los niños que pesen menos de 30 kilogramos tomen metoclopramida.



¿Cómo debo tomar metoclopramida?

Metoclopramida puede tomarse en pastillas.

Hay que tragarlas enteras con un vaso de agua.

Siempre hay que esperar 6 horas entre una toma y otra, aunque hayas vomitado o expulsado el medicamento.

Existen otras formas de administración indicadas para niños o cuando tienes problemas para tragar.

¿Cómo debo dejar de tomar metoclopramida?

Tu médico te dirá cómo dejar de tomar metoclopramida y cuándo debes terminar.



Deja de tomar metoclopramida de forma inmediata

Deja de tomar metoclopramida y acude al médico cuando tengas estos síntomas:

- Movimientos que no controlas, sobre todo, en la cabeza y en el cuello.
- Fiebre alta.
- Presión alta en las arterias.
- Temblores.
- Sudas mucho.
- Salivas más de lo habitual.
- Picor y sarpullido o irritación en la piel.



- Reacción alérgica grave, que te sucede cuando:
 - La cara, los labios o la garganta se hinchan.
 - Tienes dificultad para respirar.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas metoclopramida, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar metoclopramida?

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más metoclopramida de la debida?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas metoclopramida y cuánto has tomado.

Avisa enseguida de la sobredosis, aunque no sientas nada.

Los síntomas pueden ser:

- Movimientos que no controlas.
- Estar más dormido durante el día.
- Problemas de conocimiento.
- Estar confuso o sentirse confundido.
- Tener alucinaciones.
- Problemas de corazón.



Efectos adversos de metoclopramida

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Metoclopramida puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

Los efectos adversos habituales de metoclopramida son:

- Muy habituales
 - Estar más dormido durante el día.
 - Depresión.
 - Rigidez y temblor.
 - Estar nervioso.
 - Presión baja en las arterias.
 - Diarrea
 - Sentirte débil.
- Habituales
 - Tener la hormona prolactina alta, hormona que produce leche en los hombres y mujeres.
 - Reglas irregulares.
 - Alucinaciones.
 - Problemas de conocimiento.
 - Ritmo del corazón lentos.
 - Alergia
 - Problemas de visión.

Metoclopramida puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas metoclopramida, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE. El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos. Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de



Con el aval de

