



Dabigatran



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el dabigatran?

Dabigatran es un medicamento anticoagulante, es decir, sirve para evitar que la sangre se espese.

Cuando la sangre se coagula, puede producir una obstrucción de las venas.

Utilizamos dabigatran para evitar coágulos en las siguientes situaciones:

- Después de operaciones para colocar una prótesis en la cadera o la rodilla. Una prótesis es una pieza artificial que sustituye una parte del cuerpo, por ejemplo, los huesos de una rodilla o de una cadera.
- Cuando la persona tiene un ritmo de corazón irregular y otra enfermedad que aumenta el riesgo de formación de coágulos. Los coágulos se pueden desprender, mover hasta el cerebro y provocar un ictus. Un ictus es un infarto en el cerebro.
- Para tratar coágulos en las venas de piernas y pulmones.



Dabigatán también se puede utilizar en niños para tratar los coágulos de sangre y evitar que se vuelvan a formar.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes dabigatran.
- Sigue las normas para tomar dabigatran que te da tu médico.
- No tomes dabigatran si sangras con facilidad o tienes alguna enfermedad o situación que aumenta el riesgo de sangrado.
- Avisa a tu médico si te van a operar y tomas dabigatran.
- No tomes dabigatran si te van a operar o después de una operación sin el permiso de tu médico. Si después de una operación sientes debilidad en las piernas, problemas de estómago o de vejiga avisa enseguida a tu médico.
- Avisa tu médico si tomas dabigatran y sufres un golpe o lesión.
- No cambies de tratamiento de medicamento anticoagulante sin el permiso de tu médico.



¿Puedo tomar dabigatran?

Nunca tomes dabigatran

- Cuando tienes alergia a dabigatran.
- Cuando tienes problemas graves de riñón.
- Cuando sangras con mucha facilidad o tienes enfermedades que producen sangrado como, por ejemplo, úlcera de estómago.
- Cuando tomas otros medicamentos anticoagulantes.
- Cuando tomas medicamentos contra hongos.
- Cuando tomas medicamentos para evitar el rechazo de un trasplante.



Salud más fácil

- Cuando tomas medicamentos para el latido del corazón.
- Cuando tomas medicamentos contra la hepatitis C, que afecta al hígado.
- Cuando tienes problemas de hígado.
- Si te han puesto una válvula para ayudar al funcionamiento del corazón.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar dabigatran

- Problemas de hígado.
- Problemas de riñón.
- Problemas del corazón, incluso infarto.
- Situaciones de sangrado continuas.
- Te han hecho una biopsia, es decir, te han cortado un trozo de tejido para hacer pruebas.
- Has tenido un golpe o rotura de huesos.
- Infección de corazón.
- Inflamación de estómago o si te repiten mucho las comidas.
- Enfermedades del sistema inmunitario, que es el sistema que produce las defensas en nuestro cuerpo.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar dabigatran

- Otros medicamentos anticoagulantes.
- Para evitar el rechazo de un trasplante.
- Medicamentos para ayudar a funcionar el corazón o a controlar el latido.
- Contra la Hepatitis C, que afecta al hígado.
- Que puedan provocar sangrados.
- Antiinflamatorios, es decir, para evitar dolor o enrojecimiento de una zona del cuerpo por golpes, por infecciones o sustancias que irritan.
- Para el tratamiento de infección por hongos.
- Contra el sida.
- Antidepresivos.
- Algunos medicamentos para tratar la epilepsia.



- Algunos antibióticos.
- Algunas plantas naturales, como Hierba de San Juan.



¿Cuánto dabigatran puedo tomar?

La dosis y duración del tratamiento dependerá de tu situación.

Las situaciones pueden ser:

- **Evitar la formación de coágulos de sangre después de una operación para poner una prótesis de rodilla o cadera.**

La cantidad recomendada son 220 miligramos 1 vez al día.

Para las personas con problemas de riñón o si tienen más de 75 años, la cantidad recomendada es de 150 miligramos 1 vez al día.

Entre 1 hora y 4 horas después de una operación para poner una prótesis en la rodilla, el paciente tomará 110 miligramos.

Después tomará 220 miligramos una vez al día durante 10 días.

Entre 1 hora y 4 horas después de una operación para poner una prótesis en la cadera, el paciente tomará 110 miligramos.

Después tomará 220 miligramos una vez al día durante 28 días como mínimo y 35 días como máximo.

Antes de tomar dabigatran, consulta con tu médico si estas tomando alguna otra medicación.



- **Prevenir la formación de coágulos si tienes un ritmo de corazón irregular unido a otra enfermedad. También para evitar coágulos en las venas de los brazos y las piernas.**

La cantidad recomendada es de 300 miligramos en 2 tomas al día de 150 miligramos cada una. Para las personas con más de 80 años, la dosis recomendada es de 220 miligramos en 2 tomas al día de 110 miligramos cada una.

Antes de tomar dabigatran, consulta con tu médico si tomas otro medicamento o si te han operado para ponerte algún aparato para ayudar a que tu sangre circule mejor.

- **Para niños.**
Los niños deben tomar dabigatran 2 veces al día, a la misma hora todos los días, con una diferencia de 12 horas entre una toma y otra.

El médico dirá la cantidad de dabigatran al día que tiene que tomar el niño.

La cantidad depende de la edad y el peso del niño.

La cantidad mínima será de 150 miligramos al día en 2 tomas de 75 miligramos cada toma.

La cantidad máxima puede ser de 600 miligramos en 2 tomas de 300 miligramos cada toma.

Sigue las indicaciones de tu médico sobre la cantidad de dabigatran a tomar y la duración del tratamiento.



¿Cómo debo tomar dabigatran?

Dabigatran se toma en cápsulas con un vaso de agua.

También puede tomarlo con las comidas.

Debes tomar las cápsulas a la misma hora todos los días.

No mastiques ni abras las cápsulas para tomar solo su contenido porque puede aumentar el riesgo de sangrado.

Dabigatran también está disponible en granulado recubierto, es decir, en sobres.

Toma el granulado acompañado de alimentos o de zumo de manzana.

No lo mezcles con leche

ni con alimentos blandos que contengan productos lácteos.

¿Cómo debo dejar de tomar dabigatran?

Sigue las indicaciones de tu médico.

Nunca dejes de tomar dabigatran de forma repentina.

Tu médico te dirá cómo dejar de tomar dabigatran y cuándo debes terminar.

Si dejas de tomar dabigatran antes de lo indicado por tu médico puede que sufras coágulos de sangre.

Llama a tu médico si notas problemas de estómago después de tomar dabigatran.



Deja de tomar dabigatran de forma inmediata

Deja de tomar dabigatran y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:



- Reacción alérgica grave con dificultad para respirar o mareos.
- Episodios de sangrados excesivos o que no pueden parar, junto con sensación de debilidad, palidez, mareo, dolor de cabeza o hinchazón repentina del cuerpo.

Dabigatran puede tener otros efectos raros pero graves.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo

mientras tomas dabigatran,

avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar dabigatran?

- Cuando tomas dabigatran por una operación para poner una prótesis de rodilla o cadera:
Sáltate la toma.
Haz la siguiente toma al día siguiente a la hora de siempre.
Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.
- Cuando tomas dabigatran para el resto de situaciones y en niños.
Puedes tomar la dosis olvidada hasta 6 horas después de cuando lo tenías que haber hecho.
No la tomes si han pasado 6 horas y espera a la siguiente toma.
Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más dabigatran del debido?

Cuando tienes una sobredosis,

quiere decir que has tomado más medicamento del debido.



Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas dabigatran y cuánto has tomado.

Una sobredosis de dabigatran aumenta el riesgo de sangrado.



Efectos adversos de dabigatran

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Dabigatran puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Problemas de hígado.
Solo se pueden ver en análisis.
- Anemia por pérdida de la hemoglobina en la sangre.
La hemoglobina transporta los glóbulos rojos de la sangre que permiten llevar el oxígeno a todo el cuerpo.

Dabigatran puede tener también efectos adversos poco habituales, raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas dabigatran, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de



Con el aval de

