



Budesonida



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve la budesonida?

La budesonida es un medicamento que alivia las molestias de nariz, como irritación y taponamiento por mocos causadas tanto por alergias como por otros motivos.

Budesonida también sirve para el tratamiento de pólipos en la nariz o para prevenir que vuelvan a aparecer después de una operación para quitarlos.

Los pólipos son bultos formados por acumulación de tejidos o de células.

Este medicamento es para niños mayores de 4 años, adolescentes y adultos.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes budesonida.
- Avisa a tu médico si notas que ves borroso o tienes problemas para ver.
- Tu médico tiene que hacerte una revisión de la mucosa del interior de la nariz si usas budesonida durante mucho tiempo.
- No debes compartir el pulverizador de budesonida con nadie.



Puede provocar contagios de enfermedades.

- El tratamiento de budesonida puede ocultar otras infecciones.
- Tira el pulverizador cuando acabes el tratamiento, aunque no esté terminado.
- Si eres deportista, este medicamento te puede dar positivo en un análisis por dopaje.

El dopaje es el consumo de sustancias excitantes o estimulantes para mejorar el rendimiento al hacer ejercicio.



¿Puedo tomar budesonida?

Nunca tomes budesonida

- Cuando tienes alergia a la budesonida.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar budesonida

- Tuberculosis, que es una infección de los pulmones.
- Infecciones de las vías respiratorias.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar budesonida

- Cortisona, medicación para las inflamaciones.
- Colirio en gotas para los ojos por alergia.



¿Cuánto budesonida puedo tomar?

- Niños a partir de 6 años y personas mayores de 18 años:
Lo habitual es hacer 2 aspiraciones en cada fosa nasal por la mañana y por la noche.
Cuando tienes menos síntomas, puedes reducir la dosis a 1 aspiración en cada fosa nasal por la mañana y por la noche.
El tratamiento dura varios días hasta que desaparecen las molestias.



- Personas con pólipos nasales:
La dosis puede ser de 4 aspiraciones en cada fosa nasal por la mañana y por la noche.
- Personas con alergias:
El médico indicará la dosis.
Es recomendable que el tratamiento con budesonida empiece antes de la época de alergia.



¿Cómo debo tomar budesonida?

Budesonida se aspira por la nariz.

Necesitarás un inhalador, que estará dentro de la caja del medicamento.

Un inhalador es un aparato que sirve para tomar medicamentos inhalados por la nariz o por la boca.

Estos medicamentos sirven para tratar diferentes problemas de salud, por ejemplo, bronquitis o asma.

Hay diferentes tipos de inhaladores.

Recomendaciones generales para los inhaladores

- Aprende a usar bien tu inhalador.
Lee despacio las instrucciones.
- Sigue las indicaciones de tu médico y si tienes dudas, pregunta.
- Después de tomar un medicamento con inhalador aclárate la boca con agua.
- Lava tu inhalador 1 o 2 veces a la semana con agua templada y jabón, pero no mojes la parte metálica.
Después déjalo secar.



Deja de tomar budesonida de forma inmediata

Deja de tomar budesonida y avisa enseguida a tu médico



en los siguientes casos:

- Retención de líquidos y cuerpo hinchado.
- Hinchazón en la lengua, la garganta, los labios o la cara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas budesonida, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar budesonida?

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más budesonida del debido?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que usas budesonida y cuánto has aspirado.



Efectos adversos de budesonida

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento, porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Budesonida puede tener efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas budesonida, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer
con el número del mes y el año junto a las letras CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.
El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias
solo para tirar medicamentos.
Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero,
la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de



Con el aval de

