



Saxagliptina



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve la saxagliptina?

La saxagliptina es un medicamento que sirve para tratar la diabetes.

La *diabetes* es una enfermedad en la que los niveles de azúcar de la sangre son muy altos.

Existen diferentes tipos de diabetes.

Saxagliptina es para la diabetes de tipo 2.

Una persona tiene diabetes de tipo 2

cuando su cuerpo no produce insulina y tiene mucha azúcar en la sangre.

La insulina es una sustancia que ayuda a que el cuerpo absorba el azúcar.

Este medicamento ayuda a controlar el nivel de azúcar en la sangre.

La saxagliptina es para:

- Mayores de 18 años.
- Que tienen diabetes del tipo 2.
- Que no han mejorado con otros medicamentos contra la diabetes, con dieta y con ejercicio.



La saxagliptina se utiliza sola o junto con insulina o con otros medicamentos para tratar la diabetes.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes saxagliptina.
- Sigue la dieta y haz el ejercicio que te diga el médico.
- No cambies la insulina por este medicamento.



¿Puedo tomar saxagliptina?

Nunca tomes saxagliptina

- Cuando tienes alergia a la saxagliptina o a cualquier otro medicamento parecido para controlar la diabetes.
- Si tienes diabetes de tipo 1 o algún tipo de diabetes más complicada de lo habitual.
- Cuando estás con diálisis, que es un tratamiento para limpiarte la sangre.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar saxagliptina

- Problemas en el páncreas.
- Tomas insulina o algún otro medicamento para la diabetes.
- Las defensas de tu cuerpo están bajas, por ejemplo, por tener sida o después de un trasplante de órganos.
- Problemas porque el corazón funciona más despacio, por ejemplo, te falta el aire, aumentas de peso rápidamente o se te hinchan los pies.
- Problemas en el riñón.
- Problemas en el hígado.



Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar saxagliptina

- Insulina u otros medicamentos contra la diabetes.
- Para la epilepsia o el dolor constante.
- Medicamentos con esteroides para tratar la inflamación.
- Para tratar infecciones como la tuberculosis.
- Para las infecciones por hongos.
- Para disminuir la tensión.



¿Cuánta saxagliptina puedo tomar?

- **Adultos:**

Lo habitual es tomar 1 comprimido de 5 miligramos al día.

- **Para las personas con problema de riñón:**

Lo habitual es tomar 1 comprimido de 2,5 miligramos al día.



¿Cómo debo tomar saxagliptina?

Saxagliptina puede tomarse como comprimido.

Hay que tragarlo entero con un poco de agua y sin masticar.

Este medicamento puedes tomarlo con alimentos o sin ellos.

Puede tomarse a cualquier hora del día,

pero es recomendable tomarlo siempre a la misma hora.

El médico puede recetarte que tomes saxagliptina

junto con la insulina u otros medicamentos contra la diabetes.

Toma estos medicamentos como te diga el médico.

¿Cómo debo dejar de tomar saxagliptina?

Tu médico te dirá cómo dejar de tomar saxagliptina y cuándo debes terminar.



Deja de tomar saxagliptina de forma inmediata

Deja de tomar saxagliptina y acude al médico cuando tengas estos síntomas:

- Temblor.
- Mucho sudor.
- Ansiedad.
- Visión borrosa.
- Cosquilleo en los labios.
- Palidez en la cara.
- Cambios de humor.
- Desorientación o confusión.
- Sarpullido.
- Ronchas rojas.
- Hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta que produce dificultad para respirar.
- Dolor fuerte en el vientre.
- Dolores fuertes de articulaciones, como rodillas o tobillos.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar saxagliptina?

Puedes encontrarte en estas 2 situaciones:

- Si te toca la siguiente toma en un rato:
Sáltate la toma.
Haz la siguiente toma a la hora de siempre.
Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.
- Si todavía te queda mucho tiempo para la siguiente toma:
Toma saxagliptina enseguida.



¿Qué hago si he tomado más saxagliptina de la debida?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas saxagliptina y cuánto has tomado.

Avisa enseguida de la sobredosis, aunque no sientas nada.



Efectos adversos de saxagliptina

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Los efectos adversos habituales de saxagliptina son:

- Habituales
 - > Con Saxagliptina sola:
 - Mareo
 - Diarrea
 - Dolor de estómago
 - > Con Saxagliptina junto con otros medicamentos contra la diabetes:
 - Infección en el pecho.
 - Infección de orina.
 - Infección de nariz.
 - Inflamación de garganta
 - Dolor de estómago o de vientre.
 - Indigestión.
 - Dolor de cabeza.
 - Dolor muscular.



Salud más fácil

- Vómitos.
- Bajada de azúcar.
- Mareo.
- Cansancio.
- Gases.

Saxagliptina puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas saxagliptina, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

