



Aciclovir



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el aciclovir?

El aciclovir es un antiviral.

Es un medicamento que se utiliza para las infecciones provocadas por algunos tipos de virus.

Aciclovir sirve para tratar estas enfermedades:

- Varicela, que produce granos, sarpullidos y picor en la piel.
- Herpes simple, que produce irritación en la piel.
- Herpes genital, que produce picor en los genitales.
- Infecciones causadas por herpes zóster, que puede afectar a los nervios.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes aciclovir.
- Debes beber mucho líquido mientras tomas aciclovir.



- Sigue las indicaciones de tu médico para la dosis que debes tomar, el tiempo que debe pasar entre cada dosis y el tiempo que debes tomar el medicamento.



¿Puedo tomar aciclovir?

Nunca tomes aciclovir

- Cuando tienes alergia al aciclovir.
- Cuando tienes alergia al valaciclovir, que es un medicamento parecido al aciclovir.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar aciclovir

- Una enfermedad del riñón.
- Tienes una edad avanzada.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar aciclovir

- Contra la gota, que produce dolor e hinchazón de las articulaciones.
- Contra los ardores de estómago.
- Contra el rechazo de trasplantes.



¿Cuánto aciclovir puedo tomar?

La dosis depende de la edad y del tipo de virus:

- Personas adultas:
 - > Para infecciones producidas por el herpes simple:
Lo habitual es 200 miligramos cada 4 horas, en total 5 veces al día.
No lo tomes por la noche.



- > Cuando ya has tenido antes infección por el herpes simple:
Lo puedes tomar de 2 maneras:
 - 200 miligramos cada 6 horas, en total 4 veces al día.
 - 400 miligramos cada 12 horas, en total 2 veces al día.
- > Para prevenir infecciones por el herpes simple en personas con defensas bajas:
200 miligramos cada 6 horas, en total 4 veces al día.
- > Para el tratamiento de la varicela y el herpes zóster:
Lo habitual es 800 miligramos cada 4 horas, en total 5 veces al día,
No lo tomes por la noche.
- Niños:
 - > Para infecciones producidas por el herpes simple y para prevenirlas en niños con defensas bajas:
 - Niños y adolescentes de 2 a 18 años:
Lo habitual es 200 miligramos cada 4 horas,
en total 5 veces al día.
No hay que tomarlo por la noche.
 - Lactantes, de 28 días a 23 meses:
Lo habitual es 100 miligramos cada 4 horas,
en total 5 veces al día.
No hay que tomarlo por la noche.
 - > Para el tratamiento de varicela:
 - Niños mayores de 6 años y adolescentes:
Lo habitual es 800 miligramos 4 veces al día.
 - Niños entre 2 y 6 años:
Lo habitual es 400 miligramos 4 veces al día.



¿Cómo debo tomar aciclovir?

Puedes tomar aciclovir de las siguientes formas:

- Disuelve el comprimido en agua y remueve bien.
- También puedes tragar el comprimido entero con ayuda de un poco de agua.

Los comprimidos pueden ser de 200 miligramos, 500 miligramos, 800 miligramos y 1.000 miligramos.

Existen otras formas de administración, como crema, pomada e inyección.

Tienes que tomar aciclovir todo el tiempo que te ha dicho tu médico, aunque te sientas bien.

Si dejas de tomarlo antes, puede que vuelvas a sentirte mal o empeorar.



Deja de tomar aciclovir de forma inmediata

Deja de tomar aciclovir y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Picor o sarpullidos rojos en la piel.
- Cardenales en la piel.
- Hinchazón en los párpados, cara, labios o en otra parte del cuerpo.
- Sonidos fuertes al respirar, como pitidos.
- Desmayo.
- Ritmo extraño del latido del corazón.
- Presión en el pecho.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas aciclovir, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar aciclovir?

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más aciclovir del debido?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas aciclovir y cuánto has tomado.

Avisa enseguida de la sobredosis, aunque no sientas nada.



Efectos adversos de aciclovir

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento, porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Aciclovir puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Dolor de cabeza.
- Mareos.
- Cansancio.
- Fiebre.
- Náuseas.
- Vómitos.
- Diarrea.
- Dolor de estómago.
- Picor o sarpullidos rojos en la piel, pueden aparecer por la luz del sol o no.



Salud más fácil

Aciclovir puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas aciclovir, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

S A N D O Z

Con el aval de

