



Captopril



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el captopril?

El captopril es un medicamento que sirve para tratar la hipertensión, es decir, la tensión alta de la sangre.

Tiene efectos en el corazón y en la circulación de la sangre.

También tiene efectos en otras partes del cuerpo.

Captopril relaja las arterias y las venas para que no se estrechen y que la persona tenga una tensión menor en la sangre.

Captopril también sirve también para:

- Tratar una persona después de tener un infarto de corazón.
- Ayudar a que el corazón bombee la sangre en personas con insuficiencia cardíaca.
La insuficiencia cardíaca es un problema del corazón.
El corazón no tiene suficiente fuerza para bombear la sangre.
- Proteger de problemas en los riñones a personas con diabetes.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes captopril.
- El médico te tomará la tensión de forma frecuente cuando empieces a tomar captopril, puedes tener el pulso más lento. También te hará análisis de sangre para ver el efecto de este medicamento en la sangre y el riñón.
- Durante el tratamiento puedes tener tos.
- Avisa a tu médico cuando tomes captopril y sientas pocos efectos o efectos muy fuertes.
- Avisa a tu médico cuando tomas captopril y te van a operar o poner anestesia para operarte.
- Evita sudar mucho o quedarte deshidratado.
Si tomas captopril, puedes tener una bajada de tensión de golpe.



¿Puedo tomar captopril?

Nunca tomes captopril

- Cuando tienes alergia al captopril.
- Cuando estás embarazada de varios meses.
- Cuando tienes diabetes y tomas otros medicamentos para la tensión.
- Cuando tienes problemas de riñón y tomas otros medicamentos para la tensión.
- Cuando has tomado captopril y se te ha hinchado la cara, los labios, la lengua o la garganta y te costaba tragar o respirar.



Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar captopril

- Dolor en el estómago con o sin náuseas o vómitos.
- Dolor de garganta o fiebre porque puedes tener una infección.
- Mareos por tensión baja.
- Vómitos o diarreas muy fuertes o continuos.
- Problemas de corazón.
- Problemas de hígado.
- Diabetes.
- Problemas en los riñones.
- Cuando te hacen tratamientos importantes para limpiar la sangre como la diálisis.
- Problemas en la piel como psoriasis o manchas.
- Tienes alergia a picaduras de abejas o avispas.
- Cuando estás haciendo una dieta de poca sal.
- Cuando toma suplementos de potasio o alimentos con mucho potasio.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar captopril

- Para eliminar líquidos.
- Para la diabetes.
- Para controlar el potasio.
- Otros medicamentos contra la hipertensión.
- Para controlar el latido del corazón.
- Para tratar infartos de corazón.
- Para el sistema nervioso.
- Para tratar problemas de gota.
- Contra el dolor.
- Para problemas de sueño.
- Para la depresión y problemas de salud mental.
- Contra el cáncer.
- Medicamentos que bajan las defensas del cuerpo.



¿Cuánto captopril puedo tomar?

- **Adultos con hipertensión**

Lo habitual es empezar con 1 comprimido de 25 miligramos o de 50 miligramos al día.

El médico puede indicar que tomes 1 o 2 comprimidos al día en dosis separadas, es decir, por la mañana y por la noche.

El médico puede aumentar la cantidad hasta 100 o 150 miligramos.

El médico también puede dar otro medicamento contra la hipertensión al mismo tiempo.
- **Adultos con problemas de corazón**
 - **Insuficiencia cardíaca**

Lo habitual es empezar con 6,25 o 12,5 miligramos 2 o 3 veces al día.

El médico puede subir la cantidad poco a poco durante varias semanas hasta 150 miligramos al día.
 - **Protección después de un ataque al corazón**

Lo habitual es empezar con 6,25 miligramos al día.

El médico puede subir la cantidad poco a poco durante varias semanas hasta 150 miligramos al día.
- **Adultos con problemas de riñón y diabetes**

Lo habitual es tomar entre 75 y 100 miligramos en varios comprimidos durante el día.
- **Mayores de 75 años, personas con problemas de riñón y otras alteraciones orgánicas**

El médico puede recomendar una dosis menor.
- **Niños y adolescentes**

El médico le indicará la dosis según el peso del niño.



¿Cómo debo tomar captopril?

Captopril puede tomarse como comprimidos.

Hay que tragarlos con un poco de agua sin masticar.

Puedes partirlos por el medio si tienes problemas para tragar.

Los comprimidos pueden ser de 25 miligramos o 50 miligramos.

Es recomendable tomar captopril siempre a la misma hora.

Puedes tomarlo con o sin comidas.

El médico puede decirte

que tomes captopril junto con otros medicamentos.

¿Cómo debo dejar de tomar captopril?

Nunca dejes de tomar captopril sin que tu médico te lo diga.

En algunos casos, tu médico te dirá cómo dejar de tomarlo poco a poco.



Deja de tomar captopril de forma inmediata

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo

mientras tomas captopril

avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar captopril?

Toma tu dosis enseguida que te acuerdes.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más captopril del debido?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas captopril y cuánto has tomado.

Los síntomas que puedes tener con una sobredosis son:

- Mareo, desmayo por bajada de tensión grave.
- Ritmo de corazón muy lento.
- Fallo de los riñones.
- Retención de líquidos o deshidratación.
- Pérdida de minerales importantes para el cuerpo, como sodio o magnesio.



Efectos adversos de captopril

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Captopril puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Pérdida de ganas de comer.
- Problemas para dormir.
- Cambios en el sentido del gusto.
- Sensación de mareo.
- Dolor de cabeza.
- Sensación de hormigueo.
- Tos y dificultad de respirar.



- Náuseas o vómitos.
- Pesadez en el estómago.
- Dolor en el abdomen.
- Diarrea.
- Estreñimiento.
- Sequedad en la boca.
- Úlcera de estómago.
- Picor en la piel, a veces con sarpullidos y a veces con fiebre.
- Caída del pelo.

Captopril puede tener también efectos adversos raros o muy raros. Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas captopril, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

SANDOZ

Con el aval de

