



Levofloxacino



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve el levofloxacino?

El levofloxacino es un antibiótico.

Es un medicamento que se utiliza para las infecciones provocadas por algunos tipos bacterias.

Levofloxacino sirve para tratar infecciones:

- Respiratorias.
- De senos paranasales, que son unos espacios alrededor de la nariz.
- De orina.
- De la próstata, que forma parte del aparato reproductor de los hombres.
- De la piel.
- Para enfermedades infecciosas, como ántrax.

Este medicamento es para mayores de 18 años.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes levofloxacino.
- Nunca tomes antibióticos para infecciones provocadas por un virus, por ejemplo, una gripe o un catarro.
- Protégete del sol mientras tomes levofloxacino.
- Levofloxacino puede afectar a los resultados de un análisis de sangre y orina.

Avisa a tu médico de que tomas este medicamento cuando él te pida un análisis.



¿Puedo tomar levofloxacino?

Nunca tomes levofloxacino

- Cuando tienes alergia al levofloxacino.
- Cuando tienes alergia a otros antibióticos del mismo tipo que levofloxacino.
- Cuando has tenido una reacción alérgica cuando has tomado algún antibiótico, por ejemplo, hinchazón en la cara o la garganta y problemas para respirar o para tragar.
- Tienes epilepsia o has tenido epilepsia.
- Has tenido problemas en los tendones, que unen los músculos y los huesos, cuando has tomado levofloxacino.
- Eres mujer y estás embarazada o alimentas a tu bebé con leche materna.



Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar levofloxacino

- Epilepsia.
- Ictus, es decir, un infarto cerebral.
- Problemas de riñón o hígado.
- Problemas en los tendones, que unen los músculos con los huesos.
- Problemas en la sangre, como pérdida de sangre, falta de hierro o de glóbulos rojos.
- Una enfermedad mental.
- Problemas de corazón, como corazón débil o con latidos lentos.
- Diabetes, es decir, azúcar en la sangre.
- Miastenia grave, que produce cansancio y debilidad en los músculos.
- Problemas de circulación de la sangre, como un aneurisma, que es un bulto grande en una arteria o una vena.

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar levofloxacino

- Tomas medicamentos con cortisona.
- Contra la coagulación de la sangre, es decir, medicamentos que mantienen la sangre líquida.
- Para problemas respiratorios.
- Contra la gota, que es una enfermedad que produce dolor en las articulaciones.
- Contra la inflamación y el dolor.
- Para evitar el rechazo de trasplantes.
- Para ajustar el ritmo del latido del corazón.
- Antidepresivos.
- Contra las alucinaciones.
- Otros antibióticos.
- Contra la acidez de estómago o úlceras de estómago.



- Suplementos de alimentación minerales, como hierro, zinc, magnesio y aluminio.



¿Cuánto levofloxacino puedo tomar?

Tu médico te indicará cuánta cantidad de levofloxacino debes tomar.

- Infecciones de senos paranasales, de pulmón y de próstata
Lo habitual es tomar un comprimido de 500 miligramos una vez al día.
- Infecciones por neumonía o de la piel
Lo habitual es tomar un comprimido de 500 miligramos 1 o 2 veces al día.
- Infecciones de orina
Lo habitual es tomar medio comprimido o un comprimido de 500 miligramos una vez al día.
- Personas mayores o con problemas de riñón
El médico puede indicarles que tomen una cantidad menor de la habitual.



¿Cómo debo tomar levofloxacino?

Levofloxacino puede tomarse como comprimidos

Hay que tragarlos con un poco de agua sin masticar.

Los comprimidos pueden partirse por la mitad.

Puedes tomar levofloxacino fuera de las comidas.

Toma levofloxacino el tiempo que el médico te diga, aunque te encuentres mejor.

Tienes que tomar todas las dosis para curar la infección.



Cuando tomas levofloxacin y alguno de estos medicamentos:

- Contra la acidez de estómago o úlceras de estómago,
- Suplementos de alimentación minerales, como hierro, zinc, magnesio y aluminio,

**tiendes que tomar levofloxacin 2 horas antes
o 4 horas después del otro medicamento.**



Deja de tomar levofloxacin de forma inmediata

Deja de tomar levofloxacin y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Dolor fuerte en el vientre o la espalda.
- Reacción alérgica con hinchazón de labios, cara, garganta o lengua, dificultad para respirar y tragar y sarpullidos en la piel.

Levofloxacin puede tener otros efectos adversos muy raros. Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas levofloxacin, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar levofloxacin?

- Si me toca la siguiente toma en un rato:
Sáltate la toma.
Haz la siguiente toma a la hora de siempre.
- Si todavía me queda mucho tiempo para la siguiente toma:
Toma levofloxacin enseguida.

**Nunca tomes el doble de cantidad
para compensar la toma olvidada.**



¿Qué hago si he tomado más levofloxacino del debido?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas levofloxacino y cuánto has tomado.

Avisa enseguida de la sobredosis, aunque no sientas nada.

Los síntomas que puedes tener con una sobredosis son convulsiones, sensación de confusión, mareo, temblores, sensación de desmayo, ardor de estómago, náuseas o ritmo extraño del latido del corazón.



Efectos adversos de levofloxacino

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento, porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Levofloxacino puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- ♦ Problemas para dormir.
- ♦ Dolor de cabeza y mareos.
- ♦ Náuseas y vómitos.
- ♦ Diarrea.
- ♦ Problemas de hígado, pero es necesario un análisis de sangre.

Levofloxacino puede tener otros efectos adversos de forma poco habitual, rara o muy rara.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas levofloxacino, avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.



Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

Un proyecto de



Con la colaboración de

SANDOZ

Con el aval de

