



Bicalutamida



RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



¿Para qué sirve la bicalutamida?

La bicalutamida es un medicamento que sirve para tratar el cáncer de próstata.

La próstata es una glándula que tienen los hombres cerca de la vejiga.

También sirve para tratar tumores avanzados y con otros medicamentos para reducir andrógenos que son hormonas masculinas.



Avisos importantes

- Nunca tomes bebidas alcohólicas cuando tomes bicalutamida.
- Ten precaución cuando conduzcas o si utilizas máquinas porque este medicamento puede causar mareos y sueño.
- Este medicamento es para hombres. Las mujeres y niños no pueden tomar este medicamento.



Salud más fácil

- Mientras tomes este medicamento tú o tu pareja deben usar métodos anticonceptivos.



¿Puedo tomar bicalutamida?

Nunca tomes bicalutamida

- Cuando tienes alergia a la bicalutamida o algún componente de este medicamento.
- Si eres una mujer, un niño o un adolescente.

Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar bicalutamida

- Tienes problemas de hígado.
- Tienes diabetes.
- Tienes problemas de corazón

Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar bicalutamida

- Para tratar una enfermedad que se llama la fiebre del heno.
La fiebre de heno es una reacción alérgica al polen.
- Para tratar las alergias.
- Para tratar los problemas de estómago.
- Para tratar problemas en la coagulación de la sangre.
- Para tratar los trasplantes de órganos o de médula ósea.
- Para tratar enfermedades cardíacas.
- Para regular la tensión alta.
- Para tratar las úlceras de estómago.
- Para tratar las infecciones de hongos en la piel y las uñas.
- Para tratar problemas con el ritmo del corazón.



- Algunos antibióticos.
- Algunos medicamentos para la salud mental



¿Cuánta bicalutamida puedo tomar?

Tu médico te indicará cuánta bicalutamida debes tomar y cuánto tiempo durará el tratamiento.

Lo habitual es tomar 1 dosis al día de 50 miligramos o 3 dosis al día de 50 miligramos.



¿Cómo debo tomar bicalutamida?

Bicalutamida puede tomarse como comprimidos.

Hay que tragarlos enteros con un poco de agua, sin masticar ni triturar.

Es recomendable tomar bicalutamida siempre a la misma hora.

Puedes tomarlo con o sin comidas.

¿Cómo debo dejar de tomar bicalutamida?

No interrumpas el tratamiento sin consultar con el médico, Incluso si te encuentras bien.

El médico te indicará la forma de disminuir la dosis hasta acabar el tratamiento.



Deja de tomar bicalutamida de forma inmediata

Deja de tomar bicalutamida y avisa enseguida a tu médico en los siguientes casos:

- Notas la piel o el blanco de los ojos de color amarillo.
- Tienes reacción alérgica grave con hinchazón de garganta o picor de piel.
- Tienes dificultad para respirar.



¿Qué hago si me he olvidado de tomar bicalutamida?

Toma la dosis cuando te acuerdes y haz la siguiente toma a la hora de siempre.

Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.



¿Qué hago si he tomado más bicalutamida de la debida?

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas bicalutamida y cuánto has tomado.



Efectos adversos de bicalutamida

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Bicalutamida puede tener los siguientes efectos adversos muy habituales:

- Aumento o sensibilidad del pecho.
- Debilidad.
- Erupciones en la piel.
- Palidez de piel.
- Problemas para respirar.

Si tu tratamiento tiene otros medicamentos combinados puedes tener los siguientes efectos adversos muy habituales:

- Sofocos.
- Vértigo.
- Dolor abdominal.
- Estreñimiento.
- Ganas de vomitar.
- Acumulación de líquido.
- Presencia de sangre en orina.

Bicalutamida puede tener los siguientes efectos adversos habituales:

- Pérdida de ganas de comer.
- Pérdida de ganas de tener relaciones sexuales.
- Problemas para tener una erección del pene.
- Depresión.
- Sueño.
- Mala digestión.
- Gases.
- Pérdida de pelo.



Salud más fácil

- Piel seca.
- Picor.
- Aumento de peso.
- Cambios en el funcionamiento del hígado.
- Ataque al corazón.
- Dolor en el pecho.

Bicalutamida puede tener otros efectos adversos raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo

mientras tomas bicalutamida

avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



Advertencias para algunos pacientes

Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Personas que tienen alergias alimentarias

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



Advertencias para conservar medicamentos

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD.

La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.



Salud más fácil

Un proyecto de



Con la colaboración de

SANDOZ

Con el aval de

