



## Glimepirida



### RECOMENDACIONES ANTES DE EMPEZAR

---

- Esta página te da información importante sobre este medicamento. Léela antes de empezar a tomarlo.
- Sigue siempre las indicaciones de tu médico o farmacéutico, sobre todo, para tomar la cantidad adecuada de medicamento o cuando tengas efectos no deseados.
- El médico te ha recetado el medicamento solo a ti. No se lo des a otra persona, aunque ella tenga síntomas parecidos.
- Cuando tengas cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico.



### ¿Para qué sirve la glimepirida?

---

Glimepirida es un medicamento que sirve para reducir los niveles de azúcar en sangre para tratar la enfermedad de la diabetes tipo 2.

El médico receta este medicamento cuando una dieta saludable, ejercicio y pérdida de peso no sirven para regular el azúcar en la sangre.

La diabetes es una enfermedad que aparece cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina o utilizarla de forma adecuada.

El cuerpo de una persona con diabetes no puede absorber la glucosa o azúcar en sangre.

La glucosa se queda circulando en la sangre y daña el cuerpo.

Glimepirida aumenta la cantidad de insulina para absorber la glucosa o azúcar en sangre.



## Avisos importantes

---

- No tomes bebidas alcohólicas cuando tomes glimepirida.
- Avisa al médico si estás embarazada, crees que puedes estar embarazada o estás dando el pecho y tomas glimepirida.
- Ten precaución si vas a conducir o utilizar máquina porque la capacidad de concentración puede reducir si tu nivel de azúcar en sangre es bajo o alto. También puedes tener problemas de visión.
- El médico debe controlar los niveles de azúcar en sangre durante el tratamiento con análisis de sangre.
- Cuando tomas glimepirida puedes tener riesgo de una reducción del azúcar en sangre. Los síntomas de niveles bajos de azúcar son:
  - Sensación de estómago vacío.
  - Dolor de cabeza.
  - Hambre intensa.
  - Ganas de vomitar.
  - Vómitos.
  - Cansancio.
  - Sueño.
  - Problemas para dormir.
  - Nerviosismo y agresividad,
  - Falta de concentración.
  - Depresión.
  - Confusión.
  - Problemas para ver y hablar.



# Salud más fácil

- Temblores.
- Alteraciones en los sentidos.
- Parálisis en algunas partes del cuerpo.
- Mareos.

La reducción del azúcar en sangre puede ocurrir:

- Si tomas las comidas a distintas horas.
- Si estás en ayunas, desnutrido o cambias la dieta.
- Si aumentas tu actividad física o bebes alcohol.
- Si tomas dosis muy altas de un medicamento que se llama gliclazida
- Si tienes trastornos de las hormonas o problemas de riñón o hígado.

Si te bajan los niveles de azúcar, debes llevar algo de azúcar siempre contigo y tomarlos cuando sientas estos síntomas.

Si el azúcar no ayuda, avisa al médico.



## ¿Puedo tomar glimepirida?

---

### **Nunca tomes glimepirida**

- Cuando tienes alergia a la glimepirida o algún componente que forma este medicamento.
- Cuando tienes diabetes tipo 1.
- Cuando tienes cetoacidosis, es decir, una complicación de la enfermedad de la diabetes.
- Cuando tienes diabetes.
- Cuando tienes enfermedades graves de riñones o hígado.
- Cuando estás embarazada crees que puedes estar embarazada o estás dando el pecho.



## **Consulta a tu médico cuando tienes alguno de estos problemas de salud y vas a tomar glimepirida**

- Cuando estás recuperándote de una lesión, operación, infección con fiebre o de otras formas de estrés.
- Tienes problemas graves de hígado.
- Tienes problemas graves de riñones.

## **Consulta a tu médico cuando tomas alguno de estos medicamentos y vas a tomar glimepirida**

- Otros medicamentos para la diabetes
- Para tratar el dolor o inflamación.
- Para tratar infecciones de orina.
- Para tratar infecciones de hongos y bacterias.
- Anticoagulantes.
- Para aumentar la masa muscular.
- Para tratamiento hormonal.
- Para la depresión.
- Para reducir los niveles de colesterol.
- Para reducir la presión sanguínea alta.
- Para controlar el latido del corazón.
- Para tratar una enfermedad que se llama gota.
- Para tratar el cáncer.
- Para perder peso.
- Para aumentar la circulación.
- Para tratar alergias
- Unas medicinas llamadas simpaticolíticos para tratar problemas del corazón.
- Para aumentar la capacidad de orinar.
- Para estimular la tiroides.
- Para enfermedades mentales graves.



- Para aumentar el ritmo del corazón.
- Para tratar el asma, la congestión, la tos y los resfriados.
- Adrenalina
- Para el estreñimiento.
- Para las convulsiones, que son movimientos bruscos.
- Para los problemas del sueño.
- Para el nerviosismo.
- Para el aumento de la presión en el ojo.
- Para tratar la tuberculosis.
- Para tratar úlceras de estómago.



## ¿Cuánto glimepirida puedo tomar?

---

Tu médico te indicará cuánto glimepirida debes tomar y cuánto tiempo durará el tratamiento.

Lo habitual es comenzar con 1 dosis de 1 miligramo 1 vez al día siempre a la misma hora.

Si es necesario, el médico subirá la dosis después de 1 o 2 semanas de tratamiento.

La dosis más grande que puedes tomar es de 6 miligramos al día.

Informa a tu médico si cambia tu peso, tu estilo de vida o estás bajo una situación de estrés. El médico puede recomendarte un cambio de dosis.



## ¿Cómo debo tomar glimepirida?

---

Glimepirida puede tomarse como comprimidos. Hay que tragarlos enteros con un poco de agua, sin masticar ni triturar.



Debes tomarlo antes o con el desayuno.

Si no desayunas, debes tomar el medicamento como el médico te indique.

## ¿Cómo debo dejar de tomar glimepirida?

El médico te indicará la forma de reducir la dosis hasta acabar el tratamiento.

Si interrumpes el tratamiento puedes tener un aumento de azúcar en sangre y complicaciones de diabetes.

El médico te indicará la forma de interrumpir el tratamiento si es necesario.



## ¿Qué hago si me he olvidado de tomar glimepirida?

---

Sáltate la toma.

Haz la siguiente toma a la hora de siempre.

**Nunca tomes el doble de cantidad para compensar la toma olvidada.**



## ¿Qué hago si he tomado más glimepirida de la debida?

---

Cuando tienes una sobredosis, quiere decir que has tomado más medicamento del debido.

Cuando tienes una sobredosis, avisa de forma inmediata:

- A tu médico o tu farmacéutico.
- Al servicio de información toxicológica: llama al teléfono 91 562 04 20

Explica que tomas glimepirida y cuánto has tomado.



## Efectos adversos de glimepirida

---

Los efectos adversos son efectos no deseados del medicamento porque tu cuerpo no tolera el medicamento o le sienta mal.

Consulta al médico si sientes alguno de los siguientes síntomas:

- Reacción alérgica con dificultad para respirar, bajada de la presión sanguínea y shock.
- La piel y los ojos se te ponen de color amarillo.
- Reacción alérgica con picor o erupción en la piel.
- Bajada de azúcar en sangre grave.

Glimepirida puede tener otros efectos adversos raros o muy raros.

Si sientes algo anormal o un cambio extraño en tu cuerpo mientras tomas glimepirida

avisa de forma urgente a tu médico o farmacéutico.



## TE RECOMENDAMOS QUE LEAS TAMBIÉN



### Advertencias para algunos pacientes

---

#### **Mujeres embarazadas o con bebés que toman leche materna**

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento en los siguientes casos:

- Tienes un tratamiento para quedarte embarazada.
- Crees que puedes estar embarazada.
- Estás embarazada.
- Alimentas a tu bebé con leche materna.

#### **Personas que tienen que conducir o utilizar máquinas**

Algunos medicamentos pueden producir sueño, nerviosismo, gran relajación u otras alteraciones que pueden ponerte en riesgo cuando conduces o utilizas máquinas.

Consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

#### **Personas que tienen alergias alimentarias**

Los medicamentos pueden estar mezclados con otros ingredientes para recubrirlos, darles un sabor o un color.

Estos ingredientes pueden producir alergias en algunas personas.

Consulta a tu médico o farmacéutico cuando tienes una alergia alimentaria.



### Advertencias para conservar medicamentos

---

Coloca siempre este medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños.

Puedes tomar el medicamento hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja.

Nunca lo tomes después de esa fecha.





## Salud más fácil

La fecha de caducidad suele aparecer con el número del mes y el año junto a las letras CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes indicado.

Tira este medicamento en el Punto SIGRE.

El Punto SIGRE es un contenedor de las farmacias solo para tirar medicamentos.

Nunca lo tires a la basura ni por el desagüe del lavabo, el fregadero, la bañera o el inodoro.

---

Un proyecto de



Con la colaboración de

**SANDOZ**

Con el aval de

